



## PREPARACIÓN PARA CIRUGÍA DE CATARATA

Comprar en Farmacia:

**ZYPRED** (Gatifloxacina 0,3% + Prednisolona acetato 1%) gotas

**BRIMOPRESS** (Brimonidina 0,2%) gotas

**FOTORRETIN** (Tropicamida 1% + Fenilefrina 2,5%) gotas

**BERLOFEN** (Bromfenac 0.09%)

## DÍA ANTERIOR A LA CIRUGÍA

Lavar la cara, párpados y región periocular (ambos ojos) con jabón de **PERVINOX 3 veces**.

Colocar en ambos ojos:

**ZYPRED:** 1 gota cada 4 horas durante el día.

## EL DÍA DE LA CIRUGÍA

Lavarse la cara con jabón de **PERVINOX**.

Comenzar 2 horas antes de la cirugía, en el ojo a operar únicamente:

**FOTORRETIN:** 1 gota cada 15 minutos

**ZYPRED:** 1 gota cada 15 minutos

(Esperar 5 minutos entre cada gota).

Si la cirugía es por la mañana: concurrir en ayunas.

Si es por la tarde: desayuno normal y sin almorzar.

Si es **HIPERTENSO:** tomar su medicación habitual.

Si es **DIABÉTICO:** no colocarse insulina ni tomar hipoglucemiantes antes de la cirugía.



## PREPARACIÓN PARA CIRUGÍA DE CATARATA



Comprar en Farmacia:

**ZYPRED** (Gatifloxacina 0,3% + Prednisolona acetato 1%) gotas

**BRIMOPRESS** (Brimonidina 0,2%) gotas

**FOTORRETIN** (Tropicamida 1% + Fenilefrina 2,5%) gotas

**BERLOFEN** (Bromfenac 0.09%)

## DÍA ANTERIOR A LA CIRUGÍA

Lavar la cara, párpados y región periocular (ambos ojos) con jabón de **PERVINOX 3 veces**.

Colocar en ambos ojos:

**ZYPRED:** 1 gota cada 4 horas durante el día.

## EL DÍA DE LA CIRUGÍA

Lavarse la cara con jabón de **PERVINOX**.

Comenzar 2 horas antes de la cirugía, en el ojo a operar únicamente:

- **FOTORRETIN:** 1 gota cada 15 minutos

- **ZYPRED:** 1 gota cada 15 minutos

(Esperar 5 minutos entre cada gota).

Si la cirugía es por la mañana: concurrir en ayunas.

Si es por la tarde: desayuno normal y sin almorzar.

Si es **HIPERTENSO:** tomar su medicación habitual.

Si es **DIABÉTICO:** no colocarse insulina ni tomar hipoglucemiantes antes de la cirugía.

## INDICACIONES POSTOPERATORIAS

Al llegar al domicilio, retirar el parche.

Higiene estricta de manos antes de colocar las gotas.

Medicación en el ojo operado:

**ZYPRED:** 1 gota cada 2 horas durante el día

**BERLOFREN:** 1 gota cada 8 horas

**BRIMOPRESS:** 1 gota cada 12 horas

(No es necesario despertarse durante la noche).

Puede realizar actividades habituales suaves.

**Es normal presentar:**

*Sensación de basurita*

*Lagrimo*

*Visión rosada*

*Encandilamiento leve*

