

PREPARACION PARA CIRUGIA DE CATARATA E INDICACIONES POSTOPERATORIAS

Comprar en Farmacia:

- BRIMOPRESS gotas
- PREDNEFRIN FORTE gotas
- VIGADEXA gotas
- FOTORRETIN gotas

DÍA ANTERIOR A LA CIRUGIA

Lavar la cara, párpados y región periocular (de ambos ojos) con jabón de PERVINOX 3 veces. Colocar desde la mañana una gota de VIGADEXA cada 4 horas en los dos ojos.

EL DÍA DE LA CIRUGIA

Lavarse la cara con jabón de PERVINOX. Colocar una gota de FOTORRETIN y una gota de VIGADEXA cada 15 minutos en el ojo que se va a operar. Comenzar dos (2) horas antes al horario de la cirugía.

Si la cirugía es en horario de la mañana: Concurrir a la cirugía en ayunas (dieta liviana la noche anterior). Si la Cirugía es en horario de la tarde: desayuno normal y concurrir sin almorzar.

Si es HIERTENSO, SI tomar la medicación normalmente.

Si es DIABETICO, NO tomar la medicación ni colocar la insulina, lo podrá hacer después de la cirugía en su domicilio

Si usa audífono, no se lo saque, úselo para su cirugía.

QUE LLEVAR EL DÍA DE LA CIRUGIA

Gotas indicadas (VIGADEXA, FOTORRETIN).

Pedido médico y autorización correspondiente de la cirugía, emitido por su obra social.

Estudios cardiológicos y de laboratorio (indispensable). Consentimiento firmado por el paciente, familiar y/o acompañante, en forma clara y prolija.

Los pacientes deberán concurrir aseados sin alhajas, uñas despintadas, sin maquillaje o crema y sin pintura en los párpados

INDICACIÓN POSTOPERATORIA

Cuando llega al domicilio Ud. mismo o un familiar saca el parche y lo tira. Higiene de las manos de quien coloca las gotas.

Si le lagrimea el ojo operado, secar con gasa estéril NO utilizar ningún otro tipo de pañuelo.

Colocar en el ojo operado:

- PREDNEFRIN FORTE : 1 gota cada 2 hs (agitar bien antes de usar)
- VIGADEXA : 1 gota cada 2 horas.
- BRIMOPRESS : 1 gota cada 12 horas.

La medicación se usa durante el día y hasta última hora (no es necesario despertarse cada 2 horas), a la hora de dormir, se duerme. Conservar los medicamentos en la puerta de la heladera. Puede ver TV. Si siente dolor puede tomar analgésicos (ejemplo: Ibuprofeno 400 mg cada 8 hs)

ES NORMAL TENER SENSACION DE BASURITA, QUE LAGRIMEE, TENER VISION ROSADA Y EL ENCANDILAMIENTO.

Si Ud. tiene dudas, dolor significativo o piensa que tiene una urgencia no dude en consultar.

Ante alguna urgencia postoperatoria comunicarse con Dr. Diego Croce. Teléfono 0299 154687147 - 0299 4772702